

Carte aide-mémoire Idacio à l'intention des patients

Cette carte décrit les informations de sécurité importantes que vous devez connaître avant et pendant le traitement avec Idacio.

Fresenius Kabi Canada Ltée

165 Galaxy Blvd, bureau 100,
Toronto, ON M9W 0C8

Numéro à contacter pour obtenir des informations

médicales : 1 877 821-7724

30 novembre 2022

FKC-4-0022-00



Cette carte contient des informations de sécurité importantes que vous devez/votre enfant doit connaître avant et pendant votre/son traitement avec Idacio.

- Gardez cette carte avec vous en tout temps et pendant 70 jours après votre dernière injection/la dernière injection de votre enfant de Idacio.
- Présentez cette carte à tout médecin ou professionnel de la santé que vous consultez/votre enfant consulte.
- Inscrivez au verso de cette carte les informations relatives aux tests ou aux traitements que vous avez subis/votre enfant a subis contre la tuberculose.

Introduction

Idacio est un médicament destiné à traiter certaines maladies qui affectent une partie du système immunitaire. Bien que Idacio puisse être efficace dans le traitement de ces maladies, certaines personnes peuvent avoir un ou plusieurs effets secondaires. Il est important de parler à votre médecin/au médecin de votre enfant des bienfaits et des effets secondaires possibles de la prise de Idacio. Ceux-ci peuvent être différents pour chaque personne.

- Le but de cette carte est de vous parler de certains des effets secondaires possibles de Idacio.
- Parmi les effets secondaires graves qui pourraient survenir, mentionnons infections, cancer et problèmes du système nerveux.
- Ce ne sont pas là tous les effets secondaires possibles de Idacio.

Avant le traitement avec Idacio

Informez votre médecin/le médecin de votre enfant de tous les problèmes de santé que vous avez eus/votre enfant a eus et de tous les médicaments que vous prenez/que votre enfant prend. Cela vous aidera et aidera votre médecin/le médecin de votre enfant à décider si Idacio convient dans votre cas/dans son cas.

Informez votre médecin si :

- Vous avez/votre enfant a une infection ou si vous présentez/votre enfant présente des symptômes d'une infection (tels que fièvre, blessures ou lésions, fatigue, problèmes dentaires);
- Vous avez/votre enfant a la tuberculose ou si vous avez été/votre enfant a été en contact étroit avec une personne atteinte de tuberculose;
- Vous avez/votre enfant a ou a eu un cancer;
- Vous avez/votre enfant a des engourdissements ou des picotements ou avez un problème qui affecte votre/son système nerveux, comme une sclérose en plaques.

Votre médecin vous examinera/examinera votre enfant pour détecter les signes et symptômes de tuberculose avant le début de votre/son traitement avec Idacio. Il se peut que vous deviez/votre enfant doit être traité pour la tuberculose avant que commence votre/son traitement avec Idacio.

Vaccinations

- Votre médecin/le médecin de votre enfant peut vous/lui suggérer de recevoir certains vaccins avant de commencer Idacio.
- Les vaccins vivants ne doivent pas vous être administrés pendant que vous prenez Idacio. Si vous avez reçu Idacio alors que vous étiez enceinte, il est important que vous en informiez le médecin avant que votre bébé reçoive un vaccin. Le bébé ne doit pas recevoir de « vaccin vivant », tel que le BCG (utilisé pour prévenir la tuberculose), dans les 5 mois suivant votre dernière injection de Idacio alors que vous étiez enceinte.

Pendant le traitement avec Idacio

Pour vous assurer que Idacio est efficace et sans danger dans votre cas/le cas de votre enfant, vous devriez/votre enfant devrait consulter régulièrement votre/son médecin pour discuter de vos/ses progrès. Informez immédiatement votre médecin/le médecin de votre enfant de tout changement dans votre état/l'état de votre enfant. Tenez votre médecin/le médecin de votre enfant informé de la façon dont Idacio agit dans votre cas/le cas de votre enfant.

- Il est important d'appeler votre médecin/le médecin de votre enfant immédiatement dès l'apparition du moindre symptôme inhabituel. Cela vous permettra de vous assurer que vous recevez/votre enfant reçoit les soins appropriés.
- De nombreux effets secondaires, y compris les infections, peuvent être pris en charge si vous en parlez immédiatement à votre médecin/au médecin de votre enfant.
- Si vous ressentez/votre enfant ressent un effet secondaire, votre médecin/le médecin de votre enfant déterminera si vous devez/si votre enfant doit poursuivre ou arrêter votre/son traitement avec Idacio. Il est important de parler avec votre médecin/le médecin de votre enfant pour savoir ce qui convient dans votre cas/le cas de votre enfant.

- Comme des effets secondaires peuvent survenir après votre dernière dose/la dernière dose de votre enfant de Idacio, informez votre médecin/le médecin de votre enfant de tout problème que vous avez/que votre enfant a eu jusqu'à 70 jours après votre dernière injection/la dernière injection de votre enfant de Idacio.
- Les bébés nés de mères qui ont reçu Idacio alors qu'elles étaient enceintes ne devraient pas recevoir de vaccins vivants jusqu'à 5 mois suivant la dernière dose de Idacio administrée à la mère.

Informez votre médecin/le médecin de votre enfant :

- de tout nouveau problème de santé que vous avez/votre enfant a eu;
- des nouveaux médicaments que vous prenez/votre enfant prend;
- de toute chirurgie ou intervention prévue dans votre cas/le cas de votre enfant.

Certaines personnes prenant Idacio peuvent éprouver de graves effets secondaires, notamment :

Infections

Idacio aide les personnes atteintes de certaines maladies inflammatoires. Il le fait en bloquant une partie du système immunitaire. Cependant, cette partie du système immunitaire aide également à combattre l'infection. Cela signifie que Idacio peut vous rendre/peut rendre votre enfant plus vulnérable aux infections ou aggraver une infection que vous pourriez avoir/que votre enfant pourrait avoir. Cela inclut des infections comme les rhumes ou des infections plus graves telle la tuberculose.

Cancer

Si vous prenez/votre enfant prend Idacio, le risque d'avoir certains types de cancers peut augmenter.

Problèmes du système nerveux

Chez certaines personnes, Idacio a donné lieu à de nouveaux problèmes du système nerveux ou a aggravé des affections existantes. Cela inclut la sclérose en plaques. Veuillez lire le dépliant d'accompagnement de Idacio pour de plus amples renseignements. Ce ne sont pas tous les effets secondaires possibles qui peuvent survenir pendant le traitement avec Idacio.

Appelez votre médecin/le médecin de votre enfant ou obtenez des soins médicaux immédiatement si vous présentez/votre enfant présente l'un des symptômes suivants de ces graves effets secondaires possibles :

Infections

- Fièvre, frissons, transpiration inhabituelle, sensation de malaise ou de fatigue plus importante que la normale, sensation ou malaise (comme des nausées ou des vomissements), diarrhée, maux d'estomac, perte d'appétit ou perte de poids, toux ou crachats de sang ou de mucus, essoufflement, problèmes à uriner, plaies cutanées, blessures ou lésions, douleurs musculaires, problèmes dentaires.

Cancer

- Sueurs nocturnes, gonflement des ganglions lymphatiques (glandes enflées) dans le cou, les aisselles, l'aîne ou d'autres zones, perte de poids, nouvelles lésions cutanées ou modification des lésions cutanées (telles que des grains de beauté ou des taches de rousseur) que vous avez/votre enfant a déjà, démangeaisons graves qui ne peuvent être expliquées.

Problèmes du système nerveux

- Engourdissement ou picotements, changements dans la vision, faiblesse musculaire, vertiges inexplicables.
- Informez votre médecin/le médecin de votre enfant de tout symptôme inhabituel que vous pourriez/votre enfant pourrait avoir pendant le traitement avec Idacio. Ce ne sont pas là tous les symptômes possibles de ces effets secondaires.

Informations pour vous/votre enfant et les professionnels de la santé impliqués dans les soins ou traitements médicaux.

Tests et traitement de la tuberculose (TB).

Cochez cette case si vous avez/votre enfant a déjà subi un test de dépistage de la TB :

OUI (vérifiez auprès du médecin si vous ne savez pas)

Cochez cette case si vous avez/votre enfant a déjà subi un test de dépistage de la TB au résultat positif :

OUI (vérifiez auprès du médecin si vous ne savez pas)

Cochez cette case si vous avez/si votre enfant a déjà pris des pilules pour traiter ou prévenir la TB :

OUI (vérifiez auprès du médecin si vous ne savez pas)

Nom du patient/de la patiente : _____

Nom du médecin (qui a prescrit Idacio) : _____

Numéro de téléphone du médecin : _____

Date de la première injection de Idacio : _____

Numéro de LOT de Idacio : _____

Dose d'injection de Idacio : _____

Date de la dernière injection de Idacio (si Idacio n'est plus utilisé) : _____

Veillez fournir les renseignements demandés en guise d'informations ultérieures pour vous/pour votre enfant et les professionnels de la santé impliqués dans vos soins ou traitements médicaux/les soins ou traitements médicaux de votre enfant.

Notes (commentaires ou questions pour votre médecin/le médecin de votre enfant) : _____
